



Avertissements[®]

agricoles Auvergne & Limousin

ISSN : 0763 - 7756

Grandes cultures

Le 1er Juin 1987

n°9

BLE : 1 foyer de Rouille jaune à BULHON (63)
 Septoriose : Intervenir en Limousin
 En Auvergne : Raisonner votre intervention
 fongicide
 Pas de traitement insecticide

BLE

Stades (Gonflement - 10
)
 (Epiaison - 10-1 à 10-4

MALADIES

★ Situation

● En Limousin

Septoriose : Progression lente

Oïdium : Virulent sur HARDI et TALENT dans quelques situations.

● En Auvergne

Rouille jaune : 1 foyer découvert à BULHON (63) sur DARIUS et CAMP-REMY.

Rouille brune : Pustules isolées dans 25 % des parcelles de l'ALLIER sur PERNEL, FESTIVAL.

Septoriose : Evolution lente - 60 % des parcelles de l'ALLIER ont des symptômes sur F3. Peu dans le PUY-DE-DOME et la HAUTE-LOIRE.

Oïdium : Attaques localisées notamment en Sud Limagne (63) et Val d'Allier (03).

★ Préconisations

▼ En Limousin

Une intervention visant la Septoriose s'impose rapidement si aucune protection n'a été assurée à la mi-mai.

Tenir compte de l'oïdium pour le choix du fongicide.

.../...

▼ En Auvergne

Attention à la Rouille jaune : ne pas hésiter à intervenir en cas de présence de foyers dans vos parcelles.

Un traitement épiaison peut se justifier notamment dans l'ALLIER seulement si la Septoriose est présente sur la F3 et aussi si des pustules de Rouille brune sont visibles sur les feuilles supérieures.

Pour l'oïdium, un traitement sera nécessaire si la maladie progresse sérieusement sur les feuilles supérieures (cas rares dans l'ensemble).

N.B.- Ne pas traiter par fortes chaleurs pour éviter des problèmes de phytotoxicité (nécroses du feuillage).

INSECTES

★ Situation

Pucerons : Rares

Limaces : Attaques faibles

Cécidomyies : Un réseau de piégeage est en place.

Actuellement, les captures sont nulles sauf au BREUIL-s/COUZE (63) où elles sont faibles.

★ Préconisations

Aucun traitement insecticide ne se justifie actuellement.

En cas d'intervention fongicide, ne pas ajouter d'insecticide dans la bouillie.

Pour les cécidomyies : Intervenir seulement si :

- Présence de cécidomyies en position de ponte sur les épis,
- Temps orageux et calme en soirée.

COLZA

ALTERNARIA

☆ Situation

Pas de symptôme sur siliques et même sur le feuillage.

☆ Préconisations

Aucune intervention ne se justifie.

BETTERAVE SUCRIERE

PUCERONS

Ils sont signalés en culture.

Pensez à votre deuxième traitement en utilisant un insecticide peu nocif pour les auxiliaires (PIRIMOR, MAVRIK B).